

Colture	Parassiti	Dose l/ha	Dose ml/hl
Ortaggi a frutto (pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (Ditteri), Nottue, Tripidi	2-3	200-300
Ortaggi a bulbo (cipolla, porro, aglio, scalogno)	Tripidi, Ditteri e Minatori fogliari (Lepidotteri)	2-3	200-300
Carota	Afidi, Ditteri, larve di Lepidotteri	2-3	200-300
Cavoli (cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza)	Afidi, Nottue, Tignole	2-3	200-300
Patata	Afidi, Dorifora, Tignola, Tripidi, Aleurodidi, Nottue	2-3	200-300
Tabacco	Afidi, Aleurodidi	2-3	200-300
Floreali e ornamentali	Afidi, Tripidi, Minatori fogliari, Cicaline, Aleurodidi, Psille, larve di Lepidotteri	2-3	200-300
Funghi coltivati	Ditteri	2-3	200-300
Forestali	Afidi, Tripidi, Minatori fogliari, Cicaline, Aleurodidi, Psille, larve di Lepidotteri	2-3	200-300

Contro i nematodi galligeni (*Meloidogyne* sp) impiegare il prodotto in fertirrigazione alla dose di 5-7 l/ha.

INTERVALLO DI SICUREZZA Sospendere il trattamento: 3 giorni prima della raccolta.

COMPATIBILITA' AZACTIVA non è compatibile con prodotti a reazione molto acida (es. argille acide) o alcalina (es. polisolfuro di calcio, polliglia bordolese, etc.).

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. A temperatura ambiente il prodotto ha una stabilità garantita di almeno 2 anni.

AVVERTENZA In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza del formulato aggiunto. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' AZACTIVA normalmente non è fitotossico ed il trattamento può essere ripetuto nello stesso appezzamento più volte durante la stagione. Alcune specie e/o varietà però si sono dimostrate sensibili all'azadiractina. Durante seguenti varietà di pero si possono manifestare sintomi di fitotossicità: *Abate Fetel, Alexander Lukas, Bristol Cross, Coscia, Conference, Decana del Comizio, Decana d'Inverno, Guyot, HW 606, Illinois 13bars 83 Maxi Vereinsdechant, Trévoux, Lectier, Pierre Corneille, Santa Maria*. Le specie ornamentali sensibili sono: *Begonia semperflorens, Chrysanthema, Euphorbia pulcherrima (Peter star, Cortez), Gerbera (Pretty red, Sigma, Luciana), Impatiens New Guinea, Impatiens walleriana, Pelargonium peltatum, P. zonale, Solanum rantonnetti, Saintpaulia, rosa (Papa Meiland)*. **In considerazione dell'elevato numero di varietà di pero ed ornamentali si consiglia di effettuare trattamenti su superfici ridotte con alcune piante test per verificarne la selettività.**

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura alle dosi e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE
LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Azactiva



**INSETTICIDA - NEMATOCIDA
A BASE DI AZADIRACTINA
CONCENTRATO EMULSIONABILE**

Contenuto netto: litri 1



CERRUS

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Azadiractina A g 1 (= 10 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

CERRUS sas di Ronzoni G. & C.
via Papa Giovanni XXIII, 84 21040 UBOLDO (VA)

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
IRCA Service S.r.l., s.s. Cremasca 591, n.10 - 20040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. 11648 del 7.4.2003 del Ministero della Salute

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

AZACTIVA è un insetticida di origine naturale estratto dall'albero del Neem (*Azadirachta indica*) che si caratterizza per un molteplici meccanismo di azione comprendente le attività di fagotederrenite, regolatore di crescita e con azione di riduzione della fecondità delle femmine. Per una migliore efficacia si consiglia di trattare popolazioni di insetti nei primi stadi di sviluppo.

CAMPI, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

AZACTIVA si impiega alle dosi indicate, riferite ad un ettaro di superficie, con pompe a volume normale e quantità di acqua sufficienti ad assicurare una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione. Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 7, altrimenti utilizzare un prodotto tampone. Aggiungere AZACTIVA sotto agitazione quando la botte è piena a ¾, quindi portare a volume. Utilizzare la soluzione ottenuta lo stesso giorno della preparazione. Eseguire di preferenza i trattamenti nelle prime ore del mattino o in serata. Il prodotto deve essere impiegato in modo tempestivo alla prima comparsa dei fitofagi, ripetendo eventualmente il trattamento con un intervallo di 7-10 giorni. In caso di piogge entro 8 ore dall'applicazione, si consiglia di ripetere il trattamento.

Colture	Parassiti	Dose l/ha	Dose ml/hl
Actinidia	Aleurodidi, Cicaline	2-3	200-300
Agumi (arancio, limone, pompelmo, mandarino)	Afidi, Minatori fogliari (Lepidotteri), Aleurodidi, Cicaline, Tripidi	2-3	200-300
Drupacee (albicocco, pesco, nettarine, susino)	Afidi, Cicaline, Minatori fogliari (Lepidotteri), Tripidi	2-3	200-300
Ciliegio	Afidi	2-3	200-300
Fragola	Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Nottue	2-3	200-300
Pero	Afidi, Psilla	2-3	200-300
Melo	Afidi, Cheimatobia, Cicaline, Minatori fogliari (Lepidotteri), Tripidi	2-3	200-300
Olivo	Tignole, Tripidi	2-3	200-300
Vite	Cicaline, Tripidi, Tignole	2-3	200-300
Ortaggi a foglia (lattuga, scarola, indivia, spinacio, bietola da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, cicoria, rucola, radichchio)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (Ditteri), Nottue	2-3	200-300